

用藥指導單張

衛教小組 DG10730301

學名：Mirabegron

商品名：BETMIGA 50MG

中文名：貝坦利持續性藥效錠



一、此藥品的用途是什麼？

單一治療

治療伴有急尿、頻尿和/或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。

與蕈毒鹼性拮抗劑併用

與蕈毒鹼性拮抗劑solifenacin succinate 併用可用於治療伴有急尿、頻尿和/或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

單一治療

Betmiga 的建議起始劑量為25mg 一天一次，可隨餐或空腹服用。25 mg 可在八週內出現療效。可根據病人之療效和耐受性增加劑量至50mg 一天一次。

與蕈毒鹼性拮抗劑Solifenacin Succinate 併用

併用治療的建議起始劑量為Betmiga 25mg 一天一次和solifenacin succinate 5mg 一天一次。在4 至8 週後，可根據病人之療效和耐受性將Betmiga 劑量增至50mg 一天一次。

Betmiga和 solifenacin succinate 可隨餐或空腹服用。

應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 可隨餐或空腹服用，應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。
2. Betmiga是弱效P-glycoprotein抑制劑，若與digoxin併用須監測digoxin血中濃度。
3. Betmiga可升高血壓。建議定期量血壓，特別是高血壓患者。
4. 不建議Betmiga使用於末期腎病的患者，或重度肝功能不全的患者（Child-Pugh Class C）。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DG10730301

學名：Mirabegron

商品名：BETMIGA 50MG

中文名：貝坦利持續性藥效錠



四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、頭痛、高血壓、腹瀉、便秘、頭暈和心搏過速。

六、此藥儲存時的條件為何？

30°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師