

用藥指導單張

衛教小組 DA12600101

學名：Vericiguat micronized

商品名：VERQUVO 10MG (自費)

中文名：偉卡沃膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

適用於心衰竭惡化事件後病情穩定且射出分率小於45% 之症狀性慢性心衰竭成年病人。心衰竭惡化事件係指需住院或門診靜脈利尿劑治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. VERQUVO 的建議起始劑量為搭配食物每日口服一次2.5mg。約每2 週加倍 VERQUVO 劑量，在病人可耐受的情形下達到每日一次10mg 的目標維持劑量。
2. 對於無法吞服整顆藥錠的病人，可在服藥前將VERQUVO 磨碎，並立即與水混和服用。
3. Verquvo 可與其他心臟衰竭治療併用。

三、使用時我該注意的特別事項？

VERQUVO 可能會引起症狀性低血壓。在VICTORIA 臨床試驗中，根據試驗主持人判斷為症狀性低血壓事件的不良事件，在VERQUVO 組有9.1%，安慰劑組為7.9%，且1.2%的 vericiguat 治療組病人和1.5%的安慰劑組病人其症狀性低血壓被視為嚴重不良事件。對於治療開始時收縮壓低於100 mmHg 或有症狀性低血壓的病人，尚未進行VERQUVO 治療研究。對於血量過低、嚴重左心室出口道阻塞、休息性低血壓、自主神經功能障礙、低血壓病史或併用降血壓藥物或有機硝酸鹽類藥物治療的病人，應考慮其出現症狀性低血壓的可能性。如果病人出現症狀性低血壓，應考慮調整利尿劑劑量，並對由其他原因引起的低血壓（例如：因血量過低）加以治療。如果在採取上述措施後，病人仍持續出現症狀性低血壓，應考慮暫時降低VERQUVO的劑量或中斷其治療。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

低血壓、貧血、噁心、頭暈。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA12600101

學名：Vericiguat micronized

商品名：VERQUVO 10MG (自費)

中文名：偉卡沃膜衣錠

儲存溫度不可超過30℃。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師