

用藥指導單張

衛教小組

學名：Citalopram
商品名：CIPRAM 20MG
中文名：舒憂膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

鬱症之治療及預防復發、恐慌症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

初劑量為每日20mg，可增至每日40mg，最大量為每日60mg，65歲以上的患者服用劑量應減半，亦即，每日10~30mg，抗抑鬱劑是屬於徵狀性治療，故必須長期使用，通常躁鬱症需治療4~6個月，長期治療可能需要數年，以防復發。若患者有嚴重失眠或不安現象，建議於急性期可加重鎮靜劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 由於在抗抑鬱作用出現前，已有其他作用受抑制，因此，憂鬱症患者曾有持續性傾向者自殺，一直要到抑鬱症有顯著改善，才緩解。
2. 假如患者進入狂躁期時，應停止服用Cipram並改用精神弛緩劑來治療。
3. Cipram對患者認識能力與精神運動機能無任何影響。
4. Cipram不可給予正在接受單胺氫化酶抑制劑停藥14天以上的患者，若患者肝臟機能不良，應先以低劑量治療並小心作觀察。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

觀察到的副作用通常很少、輕微或是暫時性、最常出現的症狀是噁心、出汗有增加的傾向、唾液減少、頭痛與睡眠時間的減少，通常在服藥後的第一、二星期症狀會較明顯，一旦抑鬱症改善後，這些症狀會消失。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組

學名：Citalopram
商品名：CIPRAM 20MG
中文名：舒憂膜衣錠



藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師