用藥指導單張

衛教小組 DM8970101

學　名：Sodium Lactate, CaCl2, KCl, NaCl

商品名：LACTATE RINGER'S 500ML(塑膠瓶)(非藥局發)

中文名：乳酸化林格氏注射液



一、此藥品的用途是什麼？

酸中毒、霍亂、痢疾、傷寒、自家中毒等重症之腹瀉時的水份補給、心臟衰弱、尿毒症必要時之電解質及水份之補給

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
一次500-1000ml或每公斤體重20-30ml靜脈注射或一次200ml-500ml皮下灌注。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.本劑因含Ca2+，若與體外輸血液混合，則會引起凝結之危險，應予避免。

2.高鉀血症、高鈣血症、急慢性腎不全，使用時須特別注意。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

如有類似過敏之反應，應即刻停止使用，並給予適當處置。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19