用藥指導單張

衛教小組 DM12930101

學　　名：Aprotinin+Calcium　　chloride+Factor fibrinogen+Thrombin



商品名：BERIPLAST P COMBI-SET(非藥局發)(自費)

中文名：止血纖維蛋白膠纖維蛋白止血組

一、此藥品的用途是什麼？

標準手術技不足的支持治療：

改善止血（包括出性胃、十二指腸潰瘍的內視鏡進一步治療　）

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

藥量

Beriplast 的投與體積與使用頻率應以病人根本的臨床需求為導向。

投與劑量以下列因素而決定，但非僅限於：手術治療的類型、預計使用的面積大小及方法、以及使用次數。

使用方法

於病灶表面使用。

溶液的製備與抽取及使用方式，請詳見仿單。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

投與部位產生灼熱感和刺痛感。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 請存放於 2-8° C 的冷藏。
2. 請勿冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21