


用藥指導單張

衛教小組 DA4130201

學名：Isosorbide mononitrate

商品名：coXine 20MG

中文名：冠欣錠



一、此藥品的用途是什麼？

預防狹心症之發作。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

起始劑量：於服藥的第一、二天，每日二次，相隔七小時，每次1/4-1/2錠，之後的連續兩天，每日二次，每次一錠。標準維持劑量：每日二次，每次一錠。於飯後，與大量開水吞服，不可咬碎，必要時可在睡前服用一錠，並依個別患者做劑量的調整。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 在中樞神經系統方面：治療初期可能會有暫時性的「硝酸鹽性頭痛」，這種現象在治療數天後便會減退。偶而，特別是第一次使用該藥物時，可能會有些微的眩暈或虛弱感，但此症狀會在連續治療期間逐漸消失。

2. 在心臟血管方面：剛開始治療時，偶而會出現姿勢性低血壓、心搏過速或潮紅現象，這些症狀在連續治療後，便會減退。虛脫罕見，偶而出現伴隨性的心搏徐緩性節律障礙，如果出現明顯的降壓現象，將會加重心絞痛症狀。

3. 在胃腸道方面：偶而，特別是在第一次使用該藥物時，會有噁心或嘔吐的情形。

4. 在血液方面：體內缺乏 methaemoglobin-reductase 與 diaphorase 酵素的患者，或有不正常結構的血紅素者，其血液內可

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DA4130201

學名：Isosorbide mononitrate

商品名：coXine 20MG

中文名：冠欣錠



能會出現變性血色素。

5. 在皮膚方面：極少有皮膚過敏反應。

六、此藥儲存時的條件為何？

請放置於兒童取用不到的地方，防光、防熱貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師