

用藥指導單張

衛教小組 DE15950101

學名：Semaglutide

商品名：wegovy 1.7mg(中劑量)(自費/向上)

中文名：週纖達諾特筆1.7毫克



一、此藥品的用途是什麼？

肥胖與過重之體重控制

1. 做為低熱量飲食及增加體能活動之輔助療法，適用對象為成人且初始身體質量指數 (BMI) 為 $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ (肥胖)，或 $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ 至 $< 30 \text{ kg/m}^2$ (過重) 且至少患有一項體重相關共病，例如血糖異常 (糖尿病前期或第二型糖尿病)、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠呼吸中止或心血管疾病。
2. 做為低熱量飲食及增加體能活動之輔助療法，適用對象為 12 歲以上的青少年，合併肥胖以及體重超過 60 kg。以 2.4mg 或最高耐受劑量治療 12 週後，若青少年病人的身體質量指數 (BMI) 並未下降至少 5%，應停止本品治療並重新評估病人狀況。
3. 用於具有心血管疾病且身體質量指數 (BMI) $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ 的成人病人，降低發生重大心血管不良事件 (心血管疾病死亡、非致命心肌梗塞、非致命中風) 的風險。
4. 用於正常收縮分率之心臟衰竭 (HFrEF) 且 BMI $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ 的成人病人，改善心臟衰竭症狀與其有關的身體日常活動限制，並降低心臟衰竭住院的風險。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人

每週一次給藥，從 0.25 mg 的起始劑量，逐漸遞增到 2.4 mg 的維持劑量。劑量應在 16 週期間逐漸遞增至維持劑量，以減少可能的胃腸道症狀。如果在遞增期間出現顯著的胃腸道症狀，應考慮延緩劑量遞增或減少至先前的劑量，直到症狀改善為止。如果病人不能耐受每週一次 2.4 mg 的維持劑量，可以暫時將藥量減少至每週一次 1.7 mg，最多持續 4 週。4 週後，將週纖達增加到 2.4 mg，每週一次。如果病人不能耐受 2.4 mg，則須停止使用週纖達。每週劑量不建議超過 2.4 mg。

青少年

12 歲以上的青少年，應使用與成人相同的劑量遞增時程 (請參閱表 2)。劑量應持

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE15950101

學名：Semaglutide

商品名：wegovy 1.7mg(中劑量)(自費/向上)

中文名：週纖達諾特筆1.7毫克



續增加到 2.4 mg (維持劑量) 或最高耐受劑量。每週劑量不建議超過 2.4 mg。

第二型糖尿病病人

第二型糖尿病的病人開始使用 semaglutide 時，應考慮減少併用的胰島素或胰島素促泌劑（例如磺醯脲類藥物）劑量，以減少低血糖的風險。

給藥方式

皮下使用。

週纖達應每週一次，可在一天中任何時段注射，不論餐前或餐後。週纖達應皮下注射到腹部、大腿或上臂，可以變更注射部位。週纖達不得以靜脈注射或肌肉注射方式施用。

必要時可變更每週注射的日期，但兩次注射應至少間隔 3天（超過 72小時）。選定新的注射日之後，應持續每週注射一次。

使用週纖達時，應將筆緊緊地壓在皮膚上，直到黃色條停止移動，注射大約需要 5-10 秒。

三、使用時我該注意的特別事項？

脫水

使用 GLP-1 受體促效劑可能引起胃腸道不良反應，可能進而造成脫水，在罕見的個案狀況可導致腎功能惡化。應告知病人，胃腸道副作用可能導致脫水，應注意避免體液不足。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

低血糖、噁心、腹痛、腹瀉、嘔吐、食慾減低、便秘或消化不良等。

六、此藥儲存時的條件為何？

使用中的保存期限：6 週。

初次使用前：置於冰箱冷藏（2° C 至 8° C）。

初次使用後：請存放於 30° C 以下或冰箱冷藏（2° C 至 8° C）。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師