

用藥指導單張

衛教小組 DJ11870101

學名：Palivizumab

商品名：SYNAGIS INJ 50MG/0.5ML/VIAL

中文名：西那吉斯注射液劑



一、此藥品的用途是什麼？

Palivizumab可作用於RSV疾病高危險族群之幼兒病患，包括支氣管肺發育不全 (BPD) 嬰兒、早產兒 (小於或等於35妊娠週) 及患有血液動力學上顯著之先天性心臟病 (CHD) 幼兒族群，預防因RSV感染所引起之嚴重下呼吸道疾病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

僅可以肌肉注射方式投予palivizumab。

Palivizumab的建議劑量為15毫克/公斤體重，於預期的社區內RSV 高峰季節每月投與一次。

第一劑應於RSV季節開始之前投與，並於RSV 季節每個月投與一次連續使用。為避免重複感染的危險，建議接受palivizumab 治療但仍感染RSV的兒童，於整個RSV季節期間仍持續接受每個月palivizumab 的治療。

Palivizumab的劑量為15毫克/公斤，每月一次以肌肉注射方式給藥，建議施打於大腿前外側。為避免傷及坐骨神經，不應以臀肌做為慣常的注射部位。注射時應採用標準無菌操作技術。每個月的劑量=患者體重(公斤) x15毫克/公斤 ÷ 100毫克/毫升的palivizumab。若注射體積超過1 毫升，應分次注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 使用palivizumab 後曾通報有過敏反應，包括非常罕見的過敏性反應和過敏性休克。在某些狀況下，曾通報有致死病例。
2. 應備妥嚴重過敏反應(包括過敏性反應和過敏性休克)的治療藥物，以供palivizumab 投予後緊急使用。若發生嚴重過敏反應，應馬上中止palivizumab 的治療。如同使用於此患者族群的其他藥物，如果前一次使用palivizumab 時發生較輕微的過敏，下一次使用palivizumab時應特別注意。
3. 如同其他的肌肉注射藥物，對血小板減少症或任何凝血疾病的患者，投予palivizumab 時應特別注意。
4. 僅供單次使用的palivizumab 小瓶中未含有防腐劑。為注射液劑不需調配。
5. 中度至重度的急性感染或發燒，可能須暫緩使用本品，除非醫師認為若不使用palivizumab，會有更大的風險。輕度發燒，如輕度上

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DJ11870101

學名：Palivizumab

商品名：SYNAGIS INJ 50MG/0.5ML/VIAL

中文名：西那吉斯注射液劑



呼吸道感染，通常不須暫緩使用palivizumab。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

紅疹、發燒、注射部位反應。

六、此藥儲存時的條件為何？

本品置於產品原包裝中可於2-8° C 的環境中保存36 個月。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師