


用藥指導單張

衛教小組 DJ15740101

學名：Nirsevimab

商品名：BEYFORTUS INJ 100MG/1ML(自費)

中文名：樂唯初注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

預防呼吸道融合病毒(RSV)引起的下呼吸道疾病，適用於：

- 一歲以下兒童。
- 具有易感染嚴重RSV疾病的風險因子，包括支氣管肺發育不全(BPD)或患有血液動力學上顯著之先天性心臟病(CHD)之一歲以上至未滿兩歲兒童。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一歲以下兒童出生於第一個RSV流行季，或正要進入第一個RSV流行季的一歲以下兒童，可接受單次BEYFORTUS注射。

一歲以下兒童之BEYFORTUS建議劑量

給藥時的體重小於5 kg，建議劑量50 mg，肌肉注射。

給藥時的體重等於或大於5 kg，建議劑量100 mg，肌肉注射。

具有易感染嚴重RSV疾病的風險因子，包括支氣管肺發育不全(BPD)或患有血液動力學上顯著之先天性心臟病(CHD)之一歲以上至未滿兩歲兒童BEYFORTUS建議劑量為每次200 mg (肌肉注射2劑100 mg)。

建議與前一劑BEYFORTUS間隔6個月以上。

使用心肺體外循環進行心臟手術的兒童

對於使用心肺體外循環進行心臟手術的兒童，建議在兒童術後穩定時，盡快額外施打一劑BEYFORTUS，以確保達到適當的Nirsevimab血清濃度。BEYFORTUS 的建議途徑為肌肉注射。

一歲以下：

若手術在BEYFORTUS 給藥後90天內進行，額外劑量為依據給藥當下的體重決定。依據體重的給藥劑量，請參閱表1。

若手術在BEYFORTUS 給藥後超過90天才進行，則不論體重多寡，額外劑量應給予50 mg。

一歲以上未滿兩歲：

若手術在BEYFORTUS 給藥後90天內進行，則不論體重多寡，額外劑量應給予200 mg。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DJ15740101

學名：Nirsevimab

商品名：BEYFORTUS INJ 100MG/1ML(自費)

中文名：樂唯初注射劑



若手術在BEYFORTUS 給藥後超過90天才進行，則不論體重多寡，額外劑量應給予100 mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

如同任何其他肌肉注射一樣，患有血小板減少症、任何凝血疾病，或正在接受抗凝血治療的個體使用BEYFORTUS時應小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位疼痛、皮膚紅疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

冷藏保存於2° C– 8° C (36° F–46° F)。

BEYFORTUS 可存放在室溫20° C–25° C (68° F–77° F)至多8小時。

從冰箱取出後，BEYFORTUS必須在8小時內使用，否則請丟棄。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師