

用藥指導單張

衛教小組 DQ14750201

學名：Gimeracil+Oteracil+Tegafur

商品名：GOLFER ★ 25MG (依診斷事審)

中文名：剋伏膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

(一) 胃癌：

胃癌術後輔助性化療，本品用於罹患TNM Stage II (排除T1)、IIIA或IIIB胃癌且接受過胃癌根治性手術的成年患者。

本品適用於治療無法切除的晚期胃癌。

(二) 胰臟癌：

本品適用於治療局部晚期或轉移性胰臟癌患者。

(三) 大腸直腸癌：

本品與Irinotecan合併使用於已使用含有Oxaliplatin化學療法失敗之轉移性大腸直腸癌患者。

(四) 晚期非小細胞肺癌：

適用於對含鉑之化學療法治療失敗的局部晚期或轉移性之非小細胞肺癌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本品於早、晚餐後 天共兩次給藥，連續給予28天，之後停藥14天，即為 個療程。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 若停藥期間因治療需要必須縮短時，應確認無藥物引起之臨床檢查值異常(液檢查、肝及腎功能檢查)且未發 消化道症狀，即藥物無安全性之疑慮後才可實施。但最少必須維持7天停藥期。
2. 為避免如骨髓抑制及猛爆性肝炎等嚴重不良反應，在各療程開始前及給藥期間，應 少每2週進 1次臨床檢查(液檢查、肝腎功能檢查等)，以確實監測病 狀況，若發現任何異常則應進 適當之處置，如延長停藥期間、依上述 法減量或中 本品的給藥等。特別是在 個療程完成 後 需增加劑量時，應更常進 臨床檢查。
3. 由於基礎研究(鼠)顯 ，於空腹狀態下給藥會改變 oteracil potassium的 體可 率，推測會 造成 fluorouracil (5-FU)的磷酸

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ14750201

學名：Gimeracil+Oteracil+Tegafur

商品名：GOLFER ★ 25MG (依診斷事審)

中文名：剋伏膠囊



化被抑制，降低抗腫瘤效果，故本品須於飯後服。

4. 本品與胸部或腹部放射線合併療法的有效性與安全性尚未被確立。
5. 因肝、腎功能不全患者使本品之藥動學尚未評估，故不建議使。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

骨髓抑制、肝腎功能異常、腹瀉、腸炎、間質性肺炎、心臟功能異常、口內炎、胃潰瘍、過敏。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫 (25°C) 保存，於密閉容器內，置於兒童無法取得之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師