用藥指導單張

衛教小組 DL13090201

學　名：Naltrexone

商品名：NOTHOLIC 50MG(自費)

中文名：納霍利膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療酒精成癮及拮抗類鴉片製劑的作用。

本品應為成癮管理計畫之一部分，否則無法呈現其治療效果。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
本品使用須遵循醫師之判定，切勿自行以本品治療病人，因在使用本品前7 ~ 10天，必須先停止服用類鴉片藥品。若懷疑有類鴉片藥品依賴性之可能，需先做Naloxone挑釁試驗 (naloxone challenge test)。

成年酒精成癮者：

大部分病人的建議劑量為每日一次50毫克Naltrexone Hydrochloride。在安慰劑對照試驗中顯示每日一次50毫克的Naltrexone Hydrochloride療程持續12周，對治療酒精成癮病人具有輔助療效。在這些試驗中未評估其他劑量或是療程時間。
Naltrexone Hydrochloride應僅被視為成功治療酒精成癮的眾多因子之一，與Naltrexone Hydrochloride臨床試驗有良好結果的相關因子包括治療的類型、強度及持續時間；併發症的適當處置；社會心理支持的介入；以及良好的用藥依從性。為了達到最佳的治療結果，所有治療計畫都應加強病人的依從性，尤其是藥物依從性。

成年麻醉藥品依賴者：

療程的起始劑量為25毫克 Naltrexone，若病人未出現戒斷徵象，則可將劑量改為每日50毫克Naltrexone。

每天一次50毫克Naltrexone治療後，在臨床上能阻斷注射投予之類鴉片作用。但如同其他非作用劑治療成效一般，Naltrexone只在成為廣泛治療計畫的一部分，包括確認病人按時服藥，才有其臨床價值。

三、使用時我該注意的特別事項？

禁用於急性肝炎或肝臟衰竭病人，又因具有肝臟毒性，故即使用於活動性肝病病人也須謹慎。在安全劑量與引起肝臟毒性劑量間之範圍僅在5倍以下。在建議劑量下使用本品不會產生肝臟毒性。

必須告知病人肝臟損害之危險，且於出現急性肝炎症狀時應停藥，並接受治療。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18

用藥指導單張

衛教小組 DL13090201

學　名：Naltrexone

商品名：NOTHOLIC 50MG(自費)

中文名：納霍利膜衣錠



四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

入睡困難、焦慮、神經質、腹痛/絞痛、噁心/嘔吐，無力、關節肌肉痛和頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥錠可剝半分為相等的劑量，剝半後錠劑如未使用完畢，應於25℃以下環境妥善儲存，存放超過7天之拆封後剝半錠劑請勿繼續使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18