

用藥指導單張

衛教小組 DC9530301

學名：Pethidine

商品名：PETHIDINE★ 50MG/ML (管藥二)

中文名：鹽酸配西汀注射液



一、此藥品的用途是什麼？

鎮痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一、用於疼痛解除：

使用劑量應隨疼痛程度及病人之反應而調整。雖然某些場合適於使用皮下注射，但須重複給藥時仍以肌肉注射為佳。配西汀口服效果比注射差，與Phenothiazines及多種其他精神安定劑並用時應比例減量（通常25~50%），因該類藥物會增強配西汀之作用。

成人：常用劑量為 50mg 至 100mg，肌肉注射或皮下注射。必要時，每3~4小時追加一次，緊急時可緩慢靜脈注射。Pethidine 75mg 靜脈注射，其效力約等於Morphine 10mg 靜脈注射。

小孩：常用劑量為每公斤體重 1.1mg ~ 1.76mg （唯不得超過成人劑量）。肌肉注射或皮下注射。必要時，3~4小時一次。

二、術前給藥：

成人：常用劑量為 50mg 至 100mg，肌肉注射或皮下注射。麻醉前30~90分鐘給藥。全身麻醉之輔助：以5%葡萄糖注射液或生理食鹽水稀釋成 10mg/mL，每次 10~15mg 間歇性靜脈注射。

小孩：常用劑量為每公斤體重 1mg ~ 2.2mg （唯不得超過成人劑量）。肌肉注射或皮下注射。麻醉前 30~90分鐘給藥。

三、產科止痛：

當疼痛變為規則時，其常用劑量為 50mg 至 100mg，肌肉注射或皮下注射，且可於 1~3 小時重複給藥。

注意：即使在正常腎功能之成人，不應連續使用超過48小時，或每日超過 600mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 心跳突然加快者，應小心使用。 2. 長期服用會形成成癮現象。 3. 注射液要避開光線貯存。 4. 錠劑要密封避光貯存。 5. 靜脈注射會引起血管擴張，造成血壓下降，過量注射容易發生痙攣情形。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC9530301

學名：Pethidine

商品名：PETHIDINE★ 50MG/ML (管藥二)

中文名：鹽酸配西汀注射液



D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

配西汀的最大危險與其他麻醉止痛藥一樣，會發生呼吸抑制，及某些程度的循環抑制；也有可能發生呼吸停止、休克、及心跳停止等現象。最常見的副作用包括Lightheadedness、眩暈、鎮靜、噁心、嘔吐、流汗。這些症狀尤易於發生在運動中及未經嚴重疼痛之患者；對於這些患者，建議給予較低劑量；運動中患者可使躺臥以緩和其副作用。

六、此藥儲存時的條件為何？

避光貯存於室溫下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師