

用藥指導單張

衛教小組 DG12290101

學名：Goserelin

商品名：ZOLADEX LA ★ DEPOT 10.8MG (高劑量) (依診斷事審)

中文名：諾雷德持續性注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 適用於攝護腺癌之治療。
2. 適用於停經前婦女之乳癌治療。

在開始使用本品前，醫師應先進行荷爾蒙受體測試。如果癌症屬於荷爾蒙受體陰性，則不應使用本品。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成年男性

在前腹壁施以 Zoladex LA 10.8 mg depot 皮下注射，每 12 週一次。成年女性

在前腹壁施以 Zoladex LA 10.8 mg depot 皮下注射，每 12 週一次。老年病人

老年病人無需調整劑量。

腎功能不全 (impairment) 的病人無需調整劑量。

肝功能不全 (impairment) 的病人無需調整劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. Zoladex LA 10.8mg 使用於孩童的安全性和有效性資料尚未建立，故不建議使用於孩童。
2. 施以 Zoladex LA 10.8mg 時須注意鄰近於前腹壁下方之腹膜覆蓋下腹壁動脈 (inferior epigastric artery) 及其分支。
3. 針對具有低身體質量指數 (body mass index, BMI) 或是接受抗凝血藥物治療的病人施以本品時應格外小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的不良反應包括熱潮紅、出汗及注射部位反應。

六、此藥儲存時的條件為何？

本品之儲存溫度勿超過 30°C。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師