

用藥指導單張

衛教小組 DQ1260101

學名：Everolimus

商品名：AFINITOR ★5MG (健保事審)

中文名：癌伏妥錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 合併exemestane適用於治療荷爾蒙接受體陽性、HER2受體陰性且之前使用letrozole或anastrozole復發或惡化之停經後晚期乳癌患者。
2. 適用於進展性，無法切除或轉移性分化良好或中度分化(well-differentiated or moderately-differentiated)之胰臟神經內分泌腫瘤成人患者。
3. 適用於治療在經sunitinib或sorafenib療法無效後之晚期腎細胞癌患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 應於每天同一時間服用一次，與食物或不與食物併服都可以。
2. 需以整杯水吞服整顆藥錠。AFINITOR 不可咀嚼或咬碎錠劑。對無法吞服錠劑的患者，應將Afinitor 錠劑以輕輕攪拌的方式完全溶散於一杯水（約30 毫升）中，並立即喝下。再於杯中倒入等量的水洗滌，然後將洗滌液全部喝掉，以確保服下完整劑量。
3. 建議劑量：治療荷爾蒙接受體陽性、HER2 受體陰性的停經後晚期乳癌、胰臟神經內分泌腫瘤、晚期腎細胞癌的Afinitor 建議用量為10 毫克。

三、使用時我該注意的特別事項？

若忘記服用一劑AFINITOR 時，距離正常服藥時間6 小時內仍可立即服一劑，若超過6 小時，則應跳過這次劑量，第二天再於正常服藥時間服用AFINITOR。不可服用二劑來補償忘記服用的劑量。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

口炎、感染、皮疹、疲勞、腹瀉及食慾下降。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 30℃ 以下，並避免光照及潮濕。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師