用藥指導單張

衛教小組 DE15580101

學　名：Tirzepatide

商品名：MOUNJARO 10MG/0.6ML(高劑量)(自費)

中文名：猛健樂筆



一、此藥品的用途是什麼？

作為飲食及運動療法之外的輔助治療，用於改善第二型糖尿病成人病人之血糖控制。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 建議起始劑量為一週一次2.5mg 皮下注射。劑量2.5mg 是治療起始劑量，不適用於血糖控制。
2. 四週後，將劑量增加至每週一次 5 mg 皮下注射。
3. 若需更佳的血糖控制，可在使用當前劑量至少四週後，應以2.5 mg 為單位逐次增加劑量。
4. 最大劑量為每週一次15 mg 皮下注射。

- MOUNJARO每週給藥一次，可在一天當中的任何時間，不須考慮進食與否。
- 以皮下注射方式在腹部、大腿或上臂注射。
- 每次注射應輪替注射部位。
- 當MOUNJARO與胰島素併　時，應分開給予，並切勿混　兩種藥品。可於　體同部位注射MOUNJARO和胰島素，但是注射位置不可緊鄰。

三、使用時我該注意的特別事項？

如果錯過劑量，應在漏打後4天內盡快給藥。如果已超過4天，應跳過錯過的劑量並於原本排定的　期給予下　次劑量。在前述情況下，告知病　可恢復每週　次的常規給藥時程。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

便祕、腹瀉、食慾減少、噁心、嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

未開封：儲存於2-8° C中，避免光照，請勿冷凍。

開封使用後可在最高30℃的室溫下存放長達30天。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11