用藥指導單張

衛教小組

學　名：Omega-3-Acid Ethyl Esters

商品名：OMACOR 1000MG(自費)

中文名：脂妙清軟膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

高三酸甘油酯(血)症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
起始治療每日兩次，每次1顆，　餐後服用；若未達到適當之療效反應，可增加至每日兩次，每次2顆，餐後服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 已知對魚類或甲殼類過敏者之患者，應小心使用。
2. 對於肝功能不全患者，應定期監測 ALT及AST，可能會增加 ALT值。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

打嗝異味、消化不良、味覺異常。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 應存放於30° C以下陰涼乾燥處，避免陽光照射。
2. 瓶蓋內附有乾燥劑，請勿取出或食用

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02