用藥指導單張

衛教小組 DS9670101

學　名：Ganciclovir

商品名：CYMEVENE 500MG

中文名：西美芬凍晶靜脈注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

用於治療免疫功能缺乏之巨細胞病毒感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
治療巨細胞病毒(CMV)感染之標準劑量 腎功能正常患者之劑量 誘導治療 ：5 mg/kg 靜脈輸注，時間大於1小時，每 12 小時一次，為期 14-21 天。維持治療 ：若免疫功能缺乏病患具有復發風險，可給予維持治療。5 mg/kg 靜脈輸注，時間大於1小時，每24小時一次，每週進行7天；或 6mg/kg 每天一次，每週 5 天。

三、使用時我該注意的特別事項？

使用 Cymevene 的病患可能會發生抽搐、鎮靜、頭暈及神智混亂。如果發生這些現象時，可能會影響需要警覺性的工作，包括病患駕駛和操作機械的能力。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

最嚴重和常見藥物不良反應為血液反應，包括嗜中性白血球減少症、貧血和血小板減少症。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 儲存於 30° C 以下。
2. 輸注溶液的化學和物理使用中安定性可在 2 - 8° C維持24小時。請勿冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital