


用藥指導單張

衛教小組 DD14980201

學名：Sennoside A+B

商品名：SENNAPUR 12.5MG

中文名：清立飄糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

緩解便秘。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人及12歲以上：一日1次，1次1錠，於睡前(或空腹時)服用。初次應使用最小劑量，再視通便情形增減用量。

12歲以下兒童：使用前應洽醫師診治。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有下列情形者，請勿使用

曾因本藥成分引起過敏的人。

胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。

2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

12歲以下。

3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

連續使用一星期以上。

併用其他瀉劑。

4. 其他使用上注意事項

為防止兒童誤食請妥善保管。

避免陽光直射。

勿超過建議使用量。

本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。

本藥使用期間可能會有腹瀉發生。

長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。

會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。

刺激型瀉劑無法抑制卡路里吸收，因此不能幫助減重。此類藥品會導致水瀉、腹痛與脫水，並因脫水造成短期體重下降。嚴重脫水可能會

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DD14980201

學名：Sennoside A+B

商品名：SENNAPUR 12.5MG

中文名：清立飄糖衣錠



造成顫抖、無力、視覺模糊、暈厥、腎損傷，甚至死亡，往往需要藥物治療。

過度使用刺激型瀉劑可能會導致電解質不平衡。體內鈉、鉀、鎂、磷為維持神經肌肉所需之特定電解質，破壞此平衡可能會造成大腸及心臟功能異常。為避免上述風險，需避免過度或不正確的使用瀉劑。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、嚴重腹瀉、發疹等過敏症狀、皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25℃以下乾燥處，避免陽光直接照射。。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師