用藥指導單張

衛教小組 DD12860101

學　名：Entecavir

商品名：HEPWIN 1MG

中文名：肝穩盈膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療有B型肝炎病毒複製跡象之成人及2歲以上兒童之慢性B型肝炎患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

服藥時間

HEPWIN 應空腹服用(飯前至少2 小時及飯後至少2 小時)。

成人建議劑量

肝臟尚具代償能力(Compensated Liver Disease)

對於未曾接受核苷抑制劑治療的成人和16 歲以上青少年，治療慢性B 型肝炎病毒感染的HEPWIN 建議劑量是0.5 毫克每日一次。

對於在lamivudine 治療期間有B 型肝炎病毒血症跡象或已知具lamivudine 或telbivudine 抗藥性突變rtM204I/V 含或不含rtL180M、rtL80I/V 或rtV173L 的成人和青少年中(至少16 歲)，HEPWIN 的建議劑量是每日一次1 毫克。

肝臟功能代償不全(Decompensated Liver Disease)

對於慢性B 型肝炎病毒感染以及肝臟功能代償不全的成人肝病患者，HEPWIN建議劑量為1 毫克，每日一次。

兒童患者建議劑量

對於2 歲以上且體重大於30kg 的兒童患者，應服用1 錠0.5 毫克HEPWIN錠劑，每日一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

曾有患者停止抗B 型肝炎治療(包括entecavir 治療)後B 型肝炎急性惡化的報告。停止抗B 型肝炎治療以後至少幾個月，應藉由臨床及檢驗追蹤密切監測患者的肝功能。適合的話，可能需要恢復抗B 型肝炎治療。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

用藥指導單張

衛教小組 DD12860101

學　名：Entecavir

商品名：HEPWIN 1MG

中文名：肝穩盈膜衣錠



五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、疲倦、頭暈和噁心。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15