

用藥指導單張

衛教小組 DM7410301

學名：Meropenem

商品名：mepem 250mg (低劑量)

中文名：美平乾粉注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對Meropenem具有感受性之細菌引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人一般用量為1天0.5~1g Meropenem (效價)，分2~3次投與，經30分鐘以上靜脈點滴注射。根據年齡和症狀可調整劑量，對於危重患者或是難治性感染患者，每天劑量可增至2g (效價)。

兒童患者一般用量為一天30-60mg (效價)/kg，分3次投與，經30分鐘以上靜脈點滴注射。根據年齡和症狀，可調整劑量，對於危重患者或是難治性感染患者，每天劑量增至120mg (效價)/kg。但是不能超過成人的一天最大劑量2g。

三、使用時我該注意的特別事項？

慎重給藥 (對下列病人應慎重給藥)

1. 對Carbapenem 類、Penicillin類或Cephem類抗生素有過敏史的病人。
2. 本人或父母，兄弟姐妹為易於引起支氣管哮喘，皮疹，蕁麻疹等反應體質的病人。
3. 嚴重腎功能障礙的病人 (易引起痙攣，意識障礙等中樞神經系統症狀)。
4. 嚴重肝功能障礙的病人 (有可能引起肝功能惡化)。
5. 老年人。
6. 進食不良的病人或非經口投與營養注射劑的病人，全身狀況不良的病人 (有可能引起維生素K缺乏症狀)。
7. 曾有癲癇病史者或中樞神經障礙患者，易引起痙攣，意識障礙等中樞神經症狀。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應 (大於降低生育力之反應)，但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM7410301

學名：Meropenem

商品名：mepem 250mg (低劑量)

中文名：美平乾粉注射劑



皮疹、腹瀉、軟便、噁心、嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師