用藥指導單張

衛教小組 DA0300101

學　名：Valsartan+Hydrochlorothiazide

商品名：CO-diovan 160MG/12.5MG

中文名：可得安穩膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

單一療法無法控制的高血壓，做為第二線用藥。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
本品的建議劑量為一天一粒膜衣錠。於2～4星期之內可達最大的降血壓效果。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 對嚴重鈉離子及/或體液虧欠，如正在服用高劑量的利尿劑的病患，有極少數的病例在開始本品治療之後可能發生症狀性的低血壓。必須在開始使用本品之前將納離子及/或體液虧欠的情形加以矯正。若發生低血壓，則應將病患平躺，且在需要時給予靜脈滴注生理食鹽水。在血壓穩定後在繼續治療。
2. 本品使用在單側或兩側腎動脈狹窄或單側腎動脈狹窄的病患之安全性尚未確立。
3. 腎功能不全(肌酐酸清除率>30毫升/分鐘)的病患不需要調整劑量。
4. 無膽汁鬱積之輕至中度肝功能不全的病患在使用本品時應加以注意。無膽汁鬱積之輕至中度肝功能不全的病患不需調整劑量，此藥物組合之建議劑量即80毫克的valsartan對這些病患病不過量，且肝臟疾病並不會明顯改變hydrochlorothiazide之藥物動力學。
5. 曾有報告指出thiazide利尿劑會加速或活化全身性紅斑性狼瘡。
6. Thiazide利尿劑可能會改變葡萄糖的耐受性並提高血中膽固醇、三酸甘油脂，以及尿酸濃度。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

腹痛、背痛、食慾改變、類似感冒症狀、腹瀉、口乾。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03