用藥指導單張

衛教小組 DM13400101

學　名：Minocycline

商品名：MENOCIK LYOPHILIZED INJ. 100MG

中文名：美諾幸凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒等引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

注意：

應避免快速注入，注射劑之使用僅適用於口服治療不適當或不能耐受時，應儘快改用口服治療。如長期使用靜脈注射，可能誘致血栓性靜脈炎。症狀消失後，應繼續治療至少一至二天。

成人：

一般劑量：初劑量200毫克，每12小時100毫克。每天劑量不得超過400毫克，使用本藥需先行溶解再與Sodium Chloride Injection USP, Dextrose Injection USP, Dextrose and Sodium Chloride Injection USP或Lactated Ringer’s Injection USP等注射液稀釋成 500至1000ml使用，但不得與含鈣之溶液稀釋使用。

配製成溶液後可在室溫保存24小時，不影響其力價，但稀釋後需立刻使用。

8歲以上之孩童：

初劑量為4毫克／公斤，以後每隔12小時2毫克／公斤。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 以 5 mL之無菌注射用水配製，配製後請立即稀釋於 500mL至1000mL 之不含鈣靜脈輸注液， 輸注應超過 60分鐘，避免快速注入。(藥廠提供)

2.使用本藥先行溶解後再與Sodium Chloride Injection USP, Dextrose Injection USP, Dextrose and Sodium Chloride Injection USP或Lactated Ringer’s Injection USP等注射液稀釋成 500至1000ml使用，但不得與含鈣之溶液稀釋使用。(仿單)

3.配製成溶液後可在室溫保存24小時，不影響其力價，但稀釋後需立刻使用。(仿單)

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.24

用藥指導單張

衛教小組 DM13400101

學　名：Minocycline

商品名：MENOCIK LYOPHILIZED INJ. 100MG

中文名：美諾幸凍晶注射劑



五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

應置於室溫(25° C以下)陰涼處避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.24