


用藥指導單張

衛教小組 DN14930101

學名：Diphenhydramine

商品名：DIPHENHYDRAMINE INJ 30MG

中文名：鹽酸二苯胺明注射液



一、此藥品的用途是什麼？

皮膚疾患(濕疹、皮膚炎) 枯草熱、過敏性鼻炎、急性鼻炎、血管神經性鼻炎。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人一日2~3 次，每次1ml (30mg)，皮下或肌肉注射，但必要時亦可行靜脈注射。
2. 本品以靜脈注射時，每次diphenhydramine 之劑量以10mg-50mg為宜，且其注射速率不宜超過25mg/min。

特殊族群用法用量

1. 老人宜以最低有效起始劑量開始治療。
2. 腎功能不全者應延長給藥間隔(interval)；
輕度(GFR>50mL/min)：間隔6 小時；
中度(GFR 10-50mL/min)：間隔6-12 小時；
重度(GFR<10mL/min)：間隔12-18 小時。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 注射時患者身體部位之選擇及注意：
(a). 肌肉注射時盡量避免傷及神經組織。
(b). 神經分佈區域避免注射。
2. 皮下或皮內注射有造成組織局部壞死的可能性，應盡量避免。
3. 操作機械能力
本品有嗜睡催眠之作用，故凡投予本品之患者，不宜從事機械之操作或開汽車、摩托車及自行車等，以免發生意外事件。
4. 懷孕
妊婦或有妊娠可能性之婦女，使用本品時，應特別慎重。
5. 小兒
早產兒(premature infants)及新生兒(neonate)不建議使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DN14930101

學名：Diphenhydramine

商品名：DIPHENHYDRAMINE INJ 30MG

中文名：鹽酸二苯胺明注射液



四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

- (a). 精神神經系倦怠感、神經過敏、頭痛、口渴等。
- (b). 消化系-噁心、嘔吐、下痢等症狀之出現。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下密封貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師