

用藥指導單張

衛教小組 DD12240101

學名：Lenvatinib mesilate

商品名：LENVIMA ★ 10MG(高劑量)(依診斷事審)

中文名：樂衛瑪膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

1. 分化型甲狀腺癌：適用於放射性碘治療無效之進行性，且為局部晚期或轉移性之分化型甲狀腺癌之成人病人。
2. 腎細胞癌：與pembrolizumab併用，做為晚期腎細胞癌病人的第一線治療藥物。與everolimus併用，做為曾經接受過一種抗血管新生療法的晚期腎細胞癌病人的治療藥物。
3. 肝細胞癌：適用於無法手術切除且不適合局部治療之晚期肝細胞癌病人。
4. 子宮內膜癌：與pembrolizumab併用適用於曾經以任何形式接受過全身性治療後疾病惡化，且不適合根治手術或放射治療之晚期子宮內膜癌病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Lenvima每日服用一次，可隨餐或空腹使用，須於每日同一時間服用。如果忘記服藥並且未能在 12小時內服用，應略過該次劑量並且於原定服藥時間投予下一次劑量。

分化型甲狀腺癌(DTC)的建議劑量

建議劑量為 24mg，每日口服一次直到疾病惡化或發生無法接受之毒性。

腎細胞癌(RCC)的建議劑量

併用 pembrolizumab，用於晚期腎細胞癌(RCC)的第一線治療

Lenvima建議劑量為每日口服一次 20mg，併用每 3 週靜脈輸注一次

pembrolizumab 200mg，每次輸注時間 超過 30 分鐘，直到疾病惡化或發生無法接受之毒性。

併用 everolimus，用於先前曾接受過治療的晚期腎細胞癌(RCC) Lenvima建議劑量為 18mg，併用 5mg everolimus，每日口服一次直到疾病惡化或發生無法接受之毒性。

肝細胞癌(HCC)的建議劑量

Lenvima的建議劑量是根據病人的實際體重：體重大於或等於 60 公斤(kg)的病人為 12mg，或體重小於 60 公斤(kg)的病人為 8 mg。 Lenvima每日口服一次直到疾病惡化或發生無法接受之毒性。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD12240101

學名：Lenvatinib mesilate

商品名：LENVIMA ★ 10MG (高劑量) (依診斷事審)

中文名：樂衛瑪膠囊



病惡化或發生無法接受之毒性。

子宮內膜癌 (EC) 的建議劑量

Lenvima建議劑量為每日口服一次 20mg，併用每 3 週靜脈輸注一次 pembrolizumab 200mg，每次輸注時間超過 30 分鐘，直到疾病惡化或發生無法接受之毒性。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

高血壓、疲倦、噁心、食欲減退、關節肌肉疼痛、蛋白尿、手足症候群、口腔炎、言語障礙。

六、此藥儲存時的條件為何？

30°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師