
用藥指導單張

衛教小組 DC9810301

學　名：Bethanechol

商品名：BETHANECHOL 25MG

中文名：滯尿通



一、此藥品的用途是什麼？

手術後、產後之非阻塞性尿儲留，神經性膀胱緊張力減低及尿儲留。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人劑量為10~30mg，一天3~4次。開始可用5~10mg，以後每小時重覆給與之，直到用到30mg或獲得滿意效果為止。此藥於服用30~60分鐘即可出現效果，作用可繼續1小時。
2. 孩童每天每公斤0.6mg，分次服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

服用交感神經節阻斷藥物之病人須注意，以免引起血壓過度降低，通常於血壓過度降低發生前，常有腹部症狀，於尿儲留患者，如擴約肌無法放鬆時，可能便尿被迫回流輸尿管及腎盂，此時如有尿菌症存在時。可能引起炎症。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

腹部不適，流涎，皮膚潮紅及灼熱感，流汗。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫、遮光貯存，放置於小孩拿不到之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18