

用藥指導單張

衛教小組 DN9520301

學名：Naloxone

商品名：NALOXONE HCL 0.4MG/ML

中文名：解麻注射液



一、此藥品的用途是什麼？

麻醉藥品過量之解毒劑。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人用法

已知或疑似麻醉藥品使用過量

本藥的起始量為 0.4 mg至 2mg，由靜脈注射。若未達到預期的甦甦效果或改善呼吸功能，於投藥後隔 2至3分鐘再重覆給藥。若投與本藥 10mg 仍未有任何反應，宜考慮是否診斷為鴉片類藥品引起或部分鴉片類藥品引起之中毒。若無法靜脈注射時，則可改以肌肉注射或皮下注射。

手術後發生鴉片類藥品抑制

手術中使用鴉片類藥品，於手術後要逆轉部份鴉片類藥品的抑制作用，可用低劑量的本藥。本藥的劑量可依患者的反應做調整。要回復受抑制的呼吸功能，可由 0.1mg 至 0.2mg 的劑量開始靜脈注射，每 2到3分鐘再逐次遞增注射劑量重覆給藥，直至回復到適當的程度，例如換氣通暢及清醒且無明顯的疼痛或不適。

三、使用時我該注意的特別事項？

除了使用本藥外，在鴉片類藥品急性中毒時，其他復甦方法如保持呼吸道暢通，人工呼吸器，心臟按摩與血管收縮劑，於必要時，亦應使用以挽回生命。

手術後突然逆轉鴉片美買藥品所產生的抑制作用，可能會導致噁心，嘔

吐，發汗，顫抖，心搏過速，血壓上升，痊攣，心室性I~搏過速及振

顫，肺水腫和心跳停止並可能導致死亡。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心，嘔吐，流汗，心搏過速，高血壓，痊攣，發抖，心跳停止。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DN9520301

學名：Naloxone

商品名：NALOXONE HCL 0.4MG/ML

中文名：解麻注射液



六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師