用藥指導單張

衛教小組 DA0420101

學　名：Rosuvastatin

商品名：CRESTOR 10MG(附報告)

中文名：冠脂妥膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

高膽固醇血症,高三酸甘油脂血症

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

建議起使劑量10MG口服每日一次。

需要時可於四週後將劑量調高至20MG。

每日最高劑量為20MG。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 對腎臟的影響:暫時或間歇性的蛋白尿。
2. 對骨骼肌的影響:無併發症的肌痛或橫紋肌溶解。
3. 對肝臟的影響:用於大量飲酒或曾經肝疾患的病人應小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：　不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛,頭暈,便秘,嘔吐,搔癢,皮疹,肌痛,橫紋肌溶解　。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.22