
用藥指導單張

衛教小組 DM14960101

學　名：Influenza, inactivated, whole virus

商品名：FLUARIX 0.5ML(幼兒6個月到3歲)(公費)

中文名：伏流感疫苗



一、此藥品的用途是什麼？

適用於6個月大以上兒童、青少年及成人之主動免疫接種，以預防此疫苗所涵蓋之A型與B型流感病毒所引起的流感。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Fluarix應為單劑0.5毫升注射給藥。

6個月大以上至未滿9歲且先前未曾接種流感疫苗的兒童，應於間隔至少4週後接種第二劑0.5毫升的疫苗。

Fluarix應以肌肉注射的方式接種，建議注入三角肌或大腿前外側(視肌肉量而定)。

請參考衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)發布之施打建議。

三、使用時我該注意的特別事項？

進行免疫接種之前

和所有的注射用疫苗一樣，接種場所應有適當的醫療急救設備與指導人員，以預防接種疫苗之後可能發生緊急過敏性事件。

在施打任何疫苗之後(甚至之前)都可能會對針頭注射產生心理性反應而發生暈厥(昏倒)的現象。因此一定要在適當的場所施打疫苗，以免因昏倒而受傷。

和其它疫苗一樣，急性嚴重發燒的病人應延後接種Fluarix，但輕微的感染現象(如感冒)不須延後接種疫苗。

Fluarix係用以預防此疫苗所涵蓋的病毒株及其近親病毒株。Fluarix可能無法有效預防流感病毒的所有可能病毒株。

和所有的疫苗一樣，並非所有的疫苗接種者都可產生具保護性的免疫反應。

使用注意事項

Fluarix不可以靜脈注射的方式接種。

和其它以肌肉注射方式接種的疫苗一樣，對患有血小板減少症或凝血功能障礙疾病的人接種Fluarix時應小心，因為這些病人在接受肌肉注射後可能會發生出血的現象。

全身性免疫抑制藥物與免疫功能不全

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11


用藥指導單張

衛教小組 DM14960101

學　名：Influenza, inactivated, whole virus

商品名：FLUARIX 0.5ML(幼兒6個月到3歲)(公費)

中文名：伏流感疫苗



對正在接受免疫抑制治療的病人及免疫功能不全的病人，可能無法誘發足夠的免疫反應。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位疼痛、注射部位發紅、注射部位腫脹、注射部位硬化。

六、此藥儲存時的條件為何？

請保存於冰箱中(2° C　8° C)。切勿冷凍。請將疫苗置於原始包裝內保存，避免光線照射。外盒包裝上詳細說明了貯存條件。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11