用藥指導單張

衛教小組 DM3300101

學　名：Dexamethasone

商品名：DEXAZONE 0.5MG(低劑量dexamethasone)

中文名：克倮強片



一、此藥品的用途是什麼？

倮麻質樣關節炎、倮麻質熱、過敏性疾患、結合織炎及關節炎樣疾患、皮膚疾患、過敏性及炎症性眼科疾患等。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 初劑量：每日0.5～9mg維持劑量為初劑量的1/3～1/2。每12小時1次給藥，急性及致命性情況，劑量可提高數倍。
2. 兒童應給予最低有效劑量(最好是口服)，劑量約為0.2mg/kg/24小時，分次使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 胃腸潰瘍病患使用時務需特別注意。
2. 因可能引起浮腫及血壓上升，腎臟疾患及高血壓患者應特別注意。
3. 糖尿病患者使用時有需增加Insulin藥量。
4. 服藥期間需充分補充蛋白質。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見口乾舌燥，喝多尿多，長期或大量服用則可能出現腸胃不適、四肢浮腫等，若出現腸胃道症狀，需立即告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.16

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital