
用藥指導單張

衛教小組 DH5610201

學　名：Nystatin 100,000 units

商品名：STATIN(陰道錠)V.T.

中文名：速淨陰道錠



一、此藥品的用途是什麼？

陰道念珠菌感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常每次一錠，每天1或2次(早晚各一錠)塞入陰道內，一般治療後1～3天內，症狀都很迅速減輕，大部分治療1～2星期已足夠，本品塞入後，最好仰臥約10分鐘，以使藥錠完全分散。

三、使用時我該注意的特別事項？

如有局部腫脹、發紅等過敏症狀產生，應中止使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

A 級：　對懷孕第一期（前三個月）之孕婦的對照研究試驗中，顯示該藥物對胎兒無害，且無証據顯示對懷孕後三期產生險性。

五、此藥會造成什麼副作用？

請諮詢醫師或藥師

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.12