

用藥指導單張

衛教小組 DM14420101

學名：Hydroxychloroquine

商品名：PLAQUENIL 200MG

中文名：必賴克慶膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 圓盤狀及全身性紅斑性狼瘡。
2. 慢性多形日光疹。
3. 慢性風濕性關節炎。
4. 鎌狀瘧原蟲和間日瘧原蟲引起之瘧疾。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本藥以口服給藥，每次服藥時應與餐點或牛奶併用。

瘧疾除外的其他適應症：

成年（包括老年人）

給藥的原則應給予最低有效劑量，而且以不超過6.5mg/kg/day為原則（依其理想體重計算，而非實際體重），每日劑量為200mg或400mg。

每日服用劑量為400mg的病患：治療的起始劑量為每日400mg並分次給予，然而，治療效果若有進一步明顯的改善，則劑量可降為200mg。若劑量降低至200mg後，治療反應減弱，則維持劑量應該再增加至每日400mg。

兒童

劑量的給予應為有效劑量，而且依其理想體重計算，以不超過6.5mg/kg/day為原則，因此，兒童的理想體重小於31kg者，不適合服用200mg的錠劑。

服藥時應與食物或牛奶併服。

瘧疾：

瘧疾的抑制：成人：每星期同一天服用400毫克。

嬰兒和小孩：每星期、每公斤體重的劑量為6.5mg，最高不可超過成人的劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

對Quinine敏感以及Glucose-6-phosphated ehydrogenase缺乏的病人使用Hydroxychloroquine應特別小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM14420101

學名：Hydroxychloroquine

商品名：PLAQUENIL 200MG

中文名：必賴克慶膜衣錠



的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、視力模糊、頭痛、皮膚搔癢、食慾差、腸胃不適等。

六、此藥儲存時的條件為何？

保存於室溫25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師