

用藥指導單張

衛教小組 DG9800201

學名：Tamsulosin

商品名：HARNALIDGE OCAS 0.4MG

中文名：活路利淨OCAS持續性藥效膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

良性前列腺肥大症所伴隨的下泌尿道症狀。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

起始劑量 為 tamsulosin 0.2 mg，每天一次，若反應不佳時，劑量可增加 為 Harnalidge OCAS 0.4mg 一天一粒，口服。Harnalidge OCAS 0.4 mg 宜空腹使用，因食物會增加本藥暴露量。本藥必須整粒吞服，不可磨碎或咀嚼，因為會干擾有效成分的持續性藥效。

三、使用時我該注意的特別事項？

出現姿勢性低血壓的早期徵兆時(頭暈、無力)，患者應該坐下或躺下直到症狀消失。告知病患開始使用 Harnalidge OCAS 0.4mg 治療，應避免可能發生昏厥導致受傷的情形。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

頭暈、射精障礙、姿勢性低血壓、頭痛、胃部不適感。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師