

用藥指導單張

衛教小組 DM5790401

學名：Mometasone 1mg/gm

商品名：ELOMET CREAM 5GM

中文名：皚膚美得乳膏



一、此藥品的用途是什麼？

對類固醇具感受性之皮膚炎、皮膚癢。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一天一次，薄敷於患處。如有刺激，過敏發生，應停止使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 如有刺激、過敏發生、應停用本品，並施予適當治療。如患處有明顯的感染發生，可併用抗生素和抗真菌劑，如果情況未好轉，則應停用本品，直至感染被控制住方可再用。其他如全身性類固醇易引起的副作用偶爾也會發生，如腎上腺抑制。廣體、密閉式治療易引起全身性吸收。所以在長期使用本品時，尤其嬰幼兒，需特別小心。本品不可眼用。
2. 兒童局部使用類固醇比成人病患易導致下視丘腦下垂體軸功能抑制及Cushing syndrome，因為體表面積/體重的比率較大。兒童局部使用類固醇必須限制在最小的有效治療範圍，長期的類固醇治療會干擾兒童的生長。
3. 本品對胎兒及哺乳婦女安全性未知，因此在對母體的有益性大於對胎兒的危險性時才可使用，請務必小心，不得大量或長期使用。
4. 本品局部使用類固醇而全身性吸收、尚不知是否會分泌在乳汁中，全身性的使用類固醇會分泌於乳汁中，要評估此藥對母親的重要性，再決定是否停止哺乳或停藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

局部感覺異常，癢或皮膚萎縮，但極少發生。

使用其他局部類固醇製劑可能會有的局部副作用：刺激、多毛症、色素不足、周圍皮膚炎、過敏性接觸皮膚炎、皮膚浸軟、二次感染、皺摺及汗疹。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM5790401

學名：Mometasone 1mg/gm

商品名：ELOMET CREAM 5GM

中文名：皚膚美得乳膏



六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師