

用藥指導單張

衛教小組 DB11830101

學名：Terbutaline

商品名：BUTANYL INHA. SOL'N 5MG/2ML

中文名：必坦寧吸入液



一、此藥品的用途是什麼？

支氣管氣喘、支氣管炎及肺氣腫所伴隨之支氣管痙攣之緩解。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

每一單一劑量 5mg/2ml，一日使用四次，若一次單劑量未用畢，可存於噴霧器之貯存槽，24小時內仍安定可使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

使用 β_2 刺來治療時，可能會造成嚴重的低血鉀症。建議急性氣喘的病患特別注意，因為缺氧會提高相關的危險性。在同時使用Xanthine類衍生物、類固醇、及利尿劑的情況下，會使低血鉀效應發生的可能性提高，因此建議要同時監測血鉀的濃度。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

依推薦要量使用，罕有副作用出現，可能發生之副作用如振顫、痙攣、心悸等。一但發生，通常1-2週內治療後，自然恢復。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25°C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師