

用藥指導單張

衛教小組 DB11150101

學名：Cyproheptadine

商品名：Cyproheptadine (CYTADINE) 4MG

中文名：喜達鎮錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 過敏症、搔癢症：皮膚炎症、濕疹、類濕疹性皮炎、枯草熱及季節性鼻炎、終年過敏性血管舒縮異常之鼻炎、蕁麻疹、接觸性皮炎、藥物及血清過敏反應、肛門及外陰搔癢症、昆蟲咬腫。
2. 氣喘症：通常本品對季節性氣喘之療效較內因性氣喘為佳。
3. 組織胺性頭痛：約有70~80%之療效。一般服用本品1~2小時候，頭痛症狀即迅速消失。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 2~6歲小孩-每日3次，每次1/4錠，每日總劑量以2.5錠為限。
2. 7~14歲小孩-每日3次，每次1/2錠，每日總劑量以4錠為限。
3. 成人-每日3次，每次1錠，每日總劑量以8錠為限，以上用量，視患者之反應而定，可增減劑量至適宜為止，如每日須服4次，則於睡前增服1次為宜。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 忌飲酒精製品或其他中樞神經抑制藥品。
2. 服用本品，不宜操縱須精神集中之工作；如駕駛汽車或操作其他精密機器等。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

嗜睡、食慾及體重增加。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師