

用藥指導單張

衛教小組 DA6750201

學名：Dextran 100mg, Dextrose 50mg/ml

商品名：DEXTRAN 500ML

中文名：低分子血賜多朗滴注射液



一、此藥品的用途是什麼？

出血時之血漿增量劑。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

通常成人一回 500mL，由靜脈注射。最初 24 小時投與量為 20mL/Kg 以下。預防及治療血栓症，當連續投與時，其投與量為 1 日 10mL/Kg 以下，5 日內完成。當作體外循環灌流液，其投與量為 10~20mL/Kg，但控制在 20mL/Kg 以下。另外，投與量、投與速度依年齡、體重、症狀作適宜增減。

避免長期連續使用。(儘可能短期投與，限五日內使用。)

投與途徑：必須由靜脈給予，不可皮下注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 慎重給與(下列患者慎重使用本劑)

(1) 有腎障害的患者。[可能使腎障害惡化。]

(2) 脫水狀態的患者。[可能誘發腎機能障害。]

(3) 肺水腫的患者。[水分會滯留在肺細胞間質，可能使肺水腫惡化。]

(4) 低纖維原血症或血小板減少症等出血傾向的患者。[可能會抑制血液凝固系統，促進出血傾向。]

(5) 糖尿病的患者。[因組織的葡萄糖攝入有障礙，可能使高血糖症狀惡化。]

(6) 有缺鉀傾向的患者。[隨著葡萄糖的投與，鉀移行至細胞內，造成血清鉀值暫時性降低，可能使症狀惡化。]

(7) 尿崩症的患者。[本症需接受適當治療以重建水及電解質的平衡，投與本劑可能影響水及電解質平衡。而使症狀惡化。]

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA6750201

學名：Dextran 100mg, Dextrose 50mg/ml

商品名：DEXTRAN 500ML

中文名：低分子血賜多朗滴注射液



注射部位疼痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

30°C以下貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師