

用藥指導單張

衛教小組 DA9830201

學名：Propranolol

商品名：PROPRANOLOL 10MG

中文名：心得寧



一、此藥品的用途是什麼？

狹心症、不整律（上心室性不整律、心室性心搏過速）、原發性及腎性高血壓、偏頭痛控制原發性震顫控制焦慮性心搏過速、甲狀腺毒症的輔助劑、親鉻細胞瘤。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1) 本藥宜與食物共服。

2) 劑量應依特定應用及個別病患加以調整。

一般成人劑量：

抗心絞痛劑——口服，10-20mg，一天3-4次，必要時每3-7天逐漸增加到一天320mg。

抗心律不整劑——口服，10-30mg，一天3-4次，可視需要及耐藥性調整。

預防劑（偏頭痛）——口服，初劑量20mg，一天4次，以後增到一天160-240mg 分數次服用，視需要與耐藥性逐漸增加劑量到一天240mg。

抗高血壓劑——口服，通常每天維持劑量120-240mg，必要時視需要與耐藥性逐漸增加劑量可用到640mg。

抗甲狀腺毒劑——口服，10-40mg，一天3-4次，視需要與耐受性而調整劑量。

親鉻細胞瘤——口服，手術前，20mg，一天3次為時三天，應與 α -阻斷劑共用。（切勿在 α -阻斷劑作用建立前開始使用本藥）。

特殊族群用法用量

一般兒童劑量：尚未確立。

[注意] 口服，每天每公斤體重0.5mg- 1mg，分3-4次，曾用於心室性心搏過速（Supraventricular tachycardia）。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 如有下列醫療問題存時，本藥之使用需加謹慎：過去曾有過敏之病歷；充血性心臟衰竭；糖尿病（本藥可能促進血糖過低症並損及週邊循環）；氣腫或非過敏性支氣管炎（可能促進支氣管痙攣）；肝、腎功能障礙；Raynaud's症及其他末梢血管疾病（可能產生不良反應）以及甲狀腺機能亢進（突然戒斷可增強症狀）。

2. 本藥治療期間應定期作下列檢測，用以監視病患：血球計數，糖尿病人的血糖，血壓，心、肝及腎功能。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA9830201

學名：Propranolol

商品名：PROPRANOLOL 10MG

中文名：心律錠



四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

眩暈；頭昏眼花；每分鐘少於50次之異常慢的心跳；年長者之心智錯亂；心情沮喪；減低敏捷性；有支氣管收縮素質病人之呼吸困難；發燒及喉嚨痛（由於顆粒性白血球缺乏症）；皮膚發疹（由於過敏反應）；流血及瘀傷（可能為血小板減少症）。如有手腳冰冷（可能為週邊循環減低所致）；下瀉；高劑量所致的昏昏欲睡；眼睛、嘴、皮膚乾燥；嘔吐；昏迷；

六、此藥儲存時的條件為何？

本品應儲存於緊密容器，25℃以下避光且孩童不易取得處所。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師