

用藥指導單張

衛教小組 DQ12230101

學名：Letrozole

商品名：LOVIZOL ★ 2.5MG

中文名：利妥柔膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 停經後荷爾蒙接受器呈陽性反應的初期乳癌病人之輔助治療。
2. 接受抗動情激素治療失敗的自然或人工停經後之末期乳癌病人之治療，停經後之局部晚期或轉移性乳癌婦女患者之第一線治療用藥。
3. 荷爾蒙接受器呈陽性及LN metastasis positive之乳癌病人作為Tamoxifen輔助療法之後的延伸治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人和老人

建議劑量為每日一次Letrozole 2.5毫克。

三、使用時我該注意的特別事項？

對開車與操作機器的影響 依文獻記載由於已發現使用Letrozole會造成疲勞和頭昏，並有少數病例指出會造成睏倦，所以建議患者開車或操作機器時需注意。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常通報的副作用包括熱潮紅、關節痛、噁心及疲勞。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師