用藥指導單張

衛教小組 DM6290101

學　名：Interferon beta-1b

商品名：BETAFERON 250MCG(8MIU)

中文名：貝他費隆注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

降低反覆發作型多發性硬化症的發作頻率及嚴重度。降低續發型多發性硬化症(secondary progressive multiple sclerosis)復發的頻率及嚴重度。發生單一臨床症狀(Clinically Isolated Syndrome)疑似多發性硬化症的病患，可延緩其惡化成多發性硬化症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
每隔一天皮下注射8 MIU (1 mL)

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 可能產生憂鬱症及自殺念頭，有這些傾向之病人須小心使用。
2. 可能產生骨隨抑制作用，需定期檢測全血球數及白血球分類數。
3. 心血管疾病、肺部、肝、腎疾病患者須慎用，並定期監測肝、腎功能。
4. 糖尿病患使用interferon β-1b，易發生酮酸血症。
5. 使用此藥易感染水痘及帶狀泡疹。
6. 小於18歲者不建議使用於該年齡層。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 類似感冒的症狀，發燒、肌肉痛，這些反應通常在治療幾個星期後會自行緩解。
2. 注射部位的不良反應，大都能自行復原。
3. 可能出現肝酵素升高及淋巴球數目減少的情況。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15