用藥指導單張

衛教小組 DA7350101

學　名：Fibrinogen，Thrombin

商品名：ARTISS 2ML(非藥局發)

中文名：愛締絲低溫冷凍密合劑溶液



一、此藥品的用途是什麼？

1. 燒燙傷

用途為將自體皮膚移植物(autologous skin grafts)粘合於經外科處理過的燒燙傷創面，可適用於成人及大於或等於1 歲之兒童患者。

2. 臉部整形之除皺

用途為臉部整形之除皺手術(facial rhytidectomy)(又稱face-lift)過程中的組織皮瓣粘合。

3. 不可作止血用途。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 僅供體表局部使用。不可注射。只可使用在處理過的創傷表面。
2. 使用前須先解凍。
3. 在創面塗上薄薄一層藥品。
4. 劑量：2 mL 藥品約可覆蓋100cm2 大小的表面積。
5. 小瓶及預裝針筒僅供單次使用。請拋棄未用完的內裝藥品。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 酒精、碘或重金屬離子溶液（如：消毒液）都可使蛋白粘合劑和凝血酶溶液變質。若使用這些溶液處理創面，則必須在投予ARTISS前將傷口沖洗乾淨，並盡可能使創面乾燥。
2. 塗上薄薄一層ARTISS。凝塊厚度過大，可能會延遲傷口自然癒合的過程。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

燒燙傷：植皮失敗，血腫和皮膚搔癢。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21

用藥指導單張

學　名：Fibrinogen，Thrombin

商品名：ARTISS 2ML(非藥局發)

中文名：愛締絲低溫冷凍密合劑溶液



面部除皺：血腫/血清腫。

六、此藥儲存時的條件為何？

請將ARTISS 存放在原包裝紙盒內，以避免光線。產品過期後不可使用。若產品任何組成之包裝有破損情形，請丟棄勿用。

ARTISS 預裝針筒 (冷凍)

長期：

請保存在-20℃以下的環境。

短期：

室溫解凍：未開封的包裝袋在室溫下解凍後，可在室溫環境 (15 - 25℃) 最多保存14 天 (從冷凍庫取出後起算)。

快速解凍：

一直到使用前，產品須維持在33 - 37℃ 之間。若產品已從原包裝袋中取出，或已加熱至33 - 37℃，則必須在12 個小時內使用。

解凍之後，不可再冷藏或冷凍。不可微波。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21