

用藥指導單張

衛教小組 DL13370101

學名：Amitriptyline

商品名：TRYNOL 25MG

中文名：德利能糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

憂鬱病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

抑鬱症

門診成年病人的起始劑量：

Amitriptyline 一天75mg的劑量，分次服用通常可獲得滿意的效果。若有必要，可再將劑量增加至每天總劑量150mg。增加的劑量最好在近傍晚時及/或睡前使用。Amitriptyline的鎮定效果通常出現得快而明顯，而抗抑鬱症的效果在服藥得三、四天內，即可能很顯著，或可能需連續服用30天才能達到所需之療效。

住院病人的服用劑量：

最初可能需要100mg之劑量，若有必要的話，總劑量可慢慢增加至每天服用200mg為止。少數住院病人則可能需服用到300mg才夠。

青年及老年病人的服用劑量：一般而言，這類病人應該服用較低的劑量。對於無法承受較高劑量的青年和老年病患，可能一天服用50mg即已足夠。每天所需的劑量可以分為數次服用，或一次服用，而且最好是在晚上或是睡前服藥。

遺尿症

對於六歲以下的孩童，睡前服用10mg的amitriptyline，就可有效治療遺尿症。至於稍大之孩童，若有需要，富甕劑量可以依照體重及年齡增加。6至10歲的孩童，一天可以服用10-20mg的amitriptyline；

11至16歲的小孩，每天則可能需要25-50mg的劑量。

多數病人在開始治療數天內即出現療效。對本藥有反應的病人，隨著治療時間的增長，病情的改善也會持續有所進展。而病人通常需要持續接受治療以維持療效，直到病情受到控制為止。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL13370101

學名：Amitriptyline

商品名：TRYNOL 25MG

中文名：德利能糖衣錠



五、此藥會造成什麼副作用？

口渴、排尿困難、眼內壓上升、便秘、顫抖、運動失調、嗜眠、焦躁。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於15~30℃以下密閉容器內。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師