

用藥指導單張

衛教小組 DF9540201

學名：Suxamethonium

商品名：SUCCINYL INJ. ★ 500MG/10ML (RELAXIN) (非藥局發) (自費)

中文名：能弛聖注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

外科麻醉用肌肉鬆弛劑。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

(1) 成人—IV注射—20~80mg (起初可先投與10mg的試驗劑量，以便決定病人的敏感性)。IV輸注—2.5mg/min的0.1%或0.2%的生理食鹽水(可長期使用) IM—25mg/kg，最大劑量150mg。(2) 孩童—IV注射—1~2mg/kg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 下列疾病的患者使用本品宜小心：心臟血管、肺、腎、肝或代謝性疾病；嚴重的燒傷；骨折；肌肉痙攣；青光眼；殺蟲劑中毒；貧血；營養不良；和老年人、衰弱、或最近使用毛地黃的病人。
2. 只可使用新鮮製備的溶液。在溶液中succinylcholine會迅速的水解，而且很快失去效力。
3. 在最大效應出現，要注意呼吸暫時停止的現象，如果在幾分鐘內不能恢復自發性的呼吸，就要用氧氣來控制呼吸。
4. 本品不要與抗去極化阻斷劑一起使用，因為那會延長藥效。
5. 不要將succinylcholine與barbiturate溶液或其他鹼性藥物混合，因為會造成配合禁忌。
6. 當IM注射本品時，要深部肌肉注射，在三角肌注射尤佳。起初給予較小的試驗劑量以決定藥物的敏感性。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

肌肉抽搐，心跳過慢，中度的呼吸抑制作用，肌肉虛弱，支氣管痙攣，呼吸暫停，心跳過慢，低血壓，心律不整，流涎增加，手術後的疼

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DF9540201

學名：Suxamethonium

商品名：SUCCINYL INJ. ★ 500MG/10ML (RELAXIN) (非藥局發) (自費)

中文名：能弛聖注射劑



痛，體溫過高，眼內壓增加，肌球蛋白血症，嚴重的呼吸抑制用。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師