用藥指導單張

衛教小組 DC11850201

學　名：Semaglutide

商品名：OZEMPIC INJ 4MG/3ML(高劑量)

中文名：胰妥讚注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 單一療法或與其他糖尿病治療藥物併用，治療控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。

2. 用於已有心血管疾病的第二型糖尿病病人時，可降低發生主要心血管事件（MACE：包括心血管疾病死亡、非致命性心肌梗塞、非致命性中風)之風險。

3. 用於已有慢性腎臟病的第二型糖尿病病人時，可降低eGFR 持續下降、進展至腎臟病末期或心血管疾病死亡之風險。

4. 用於改善第二型糖尿病合併周邊動脈疾病成人病人的間歇性跛行。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 起始劑量為每週一次皮下注射 0.25 mg，連續四週。0.25 mg 是初始治療的劑量，對血糖控制沒有效果。

2. 0.25 mg 劑量持續四週後，增加至每週一次 0.5 mg。

3. 每週劑量 0.5 mg 至少四週後，如果需要加強血糖控制，可增加至每週一次 1 mg。 最大建議劑量為每週一次 1 mg。

4. 在原本的 metformin 及/或 thiazolidinedione 或者是metformin 及/或鈉－葡萄糖共同轉運蛋白 2 (SGLT2) 抑制劑之外併用胰妥讚®，metformin、thiazolidinedione 或 SGLT2 抑制劑的劑量可以維持不變。

5. 胰妥讚與促胰島素分泌劑(例如 sulphonylureas)或胰島素併用時，應監測血糖，並考慮減少促胰島素分泌劑或胰島素的劑量，以減少發生低血糖的風險，尤其是一開始使用胰妥讚並降低胰島素劑量時，建議胰島素應採取逐步減少的方式。

6. 併用時磺醯脲類藥物和胰島素的劑量調整，需要血糖自我監測；只調整胰妥讚的劑量，則不需要自我監測血糖。

7. 如果錯過一劑藥物，應在 5天內儘快施打。如果超過 5天則應跳過，依原訂時程繼續注射下一劑。遇到這類情況，病人之後可恢復每週一次的用藥時程。

8. 胰妥讚與胰島素併用時，應指示病人分開注射，不可將不同藥物混合。胰妥讚和胰島素可以注射在身體同一部位，但注射處不可太靠近。

改變注射日

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.27

用藥指導單張

衛教小組 DC11850201

學　名：Semaglutide

商品名：OZEMPIC INJ 4MG/3ML(高劑量)

中文名：胰妥讚注射劑



必要時可改變每週注射的日期，但兩次注射之間應至少相隔 3 天（超過 72 小時）。選定新的注射日之後，應持續每週注射一次。

投與方式

皮下注射

胰妥讚應皮下注射到腹部、大腿或上臂，可以改變注射部位，不需調整劑量。胰妥讚不可以靜脈注射或肌肉注射方式投與。

胰妥讚應每週注射一次，可在一天中的任何時間注射，不論是否進食。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. Semaglutide 不應用於第一型糖尿病病人或治療糖尿病酮酸中毒，Semaglutide 也不能替代胰島素。胰島素依賴病人在開始接受 GLP-1 受體促效劑治療時，若快速停用胰島素或降低劑量，曾有糖尿病酮酸中毒的報告。

2. Semaglutide 用於 NYHA 第 IV 級鬱血性心衰竭病人仍缺乏治療經驗，因此不建議這些病人使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

最常通報的不良反應是胃腸道問題，包括噁心（極常見）、腹瀉（極常見）、嘔吐（常見）。

六、此藥儲存時的條件為何？

初次使用前：請存放於冰箱冷藏（2° C~8° C），避免接觸冷卻元件。

初次使用後：請存放於30° C 以下或冰箱冷藏（2° C~8° C）。請勿冷凍胰妥讚，也不要使用冷凍過的胰妥讚。注射筆使用後必須套回注射筆蓋，以避免光線照射。

使用中的保存期限：6 週。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.27