
用藥指導單張

衛教小組 DA11410101

學　名：Eplerenone

商品名：INSPRA F.C. 50MG

中文名：迎甦心膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 心肌梗塞後之心衰竭。
2. NYHA第II級(慢性)心衰竭。
3. 高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

心肌梗塞後之心衰竭

Elperenone通常與標準治療併用。建議劑量是50 mg每天一次。應由25 mg每天一次開始治療，當患者能夠忍受時，最好在 4週內把劑量調高到50 mg每天一次的目標劑量，並將血鉀濃度納入考量。在開始治療後，應根據血鉀濃度來調整劑量。目前沒有充分的資料建議eplerenone使用於兒童族群，故不建議此年齡族群使用。

NYHA第II級(慢性)心衰竭

對NYHA第II級慢性心衰竭的患者，應以25 mg每天一次的劑量開始治療，然後最好在4週內調整到50 mg每天一次的目標劑量；並應將血鉀濃度納入考量。

高血壓

Eplerenone的建議起始劑量為50 mg每天一次。Eplerenone的完整治療作用會在4週內出現。如果是對50 mg每天一次的劑量血壓反應不足的病人，請將Eplerenone的劑量調升至50 mg每天兩次。不建議使用更高的Eplerenone劑量，因為相較於 100 mg，更高劑量對血壓無更強的作用，反而會伴隨更高的高血鉀風險。

一般考量

鉀：血鉀濃度>5.0 mmol/L (或5.0 mEq/L)的患者，不應開始使用eplerenone。在開始eplerenone治療以前，開始治療或調整劑量的第一週內以及一個月後，均應測量血鉀；此後應定期評估血鉀。

併用會影響CYP3A4的製劑：

併用輕度至中度CYP3A4抑制劑(如amiodarone，diltiazem，erythromycin，saquinavir，verapamil與fluconazole)的病人，可考慮使用25毫克每天一次的起始劑量，此外，病人劑量不應超過每日25毫克。

三、使用時我該注意的特別事項？

曾有少數患者發生暈眩及暈厥反應的報告。建議在初期治療的反應確定之前，駕駛及操作機械時應多加小心。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15


用藥指導單張

衛教小組 DA11410101

學　名：Eplerenone

商品名：INSPRA F.C. 50MG

中文名：迎甦心膜衣錠



四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

高鉀血症、暈厥、頭暈。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25°C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15