

用藥指導單張

衛教小組

學名：Vasopressin

商品名：PITRESSIN ★ 20UNIT/ML

中文名：必壓生注射液



一、此藥品的用途是什麼？

食道靜脈曲張出血，尿崩症，手術後腹部膨脹，排除腹部氣影。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 血管加壓素注射 (a) 尿崩症—IM, SC 5U~10U，每天2~3次或用沾在棉絮塞入鼻腔內。噴鼻劑成人平均10~20mg (微克) 兒童半噴入鼻腔，每日1~2次。(b) 腹部發脹—IM注射5U，如果需要的話，可增加至每3~4小時10U。(c) 腹部X射線攝影術—在攝影前小時和1/2時，IM10U，(d) 流血的症狀—IV輸注20U，約花費5~10分鐘或動脈注射。

2. 血管加壓素單寧酸鹽油性懸浮劑IM 0.3至1ml (1.5至5U)，每36~72小時可再重複一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有冠狀動脈疾病的病人不可使用本品，例外要使用者也要非常小心，可能會出現狹心症發作和心肌梗塞，應該準備一些適當的治療 (如Nitroglycerin, 氧氣, 抗心律不整劑)。
2. 不可IV注射血管加壓素的單寧酸鹽 (Vasopressin tannate)
3. 癲癇、氣喘、腎疾病、甲狀腺腫，以及年老的人，年紀太輕或孕婦等服用本品宜小心。
4. 要注意，在投與單次劑量血管加壓素單寧酸鹽後36~72小時，可控制尿崩症的多尿和劇渴，投與的頻率不可大於每36~48小時一次。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應 (大於降低生育力之反應)，但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

面部蒼白，噁心，胃腸障礙，子宮強直性痙攣，眩暈、發汗，頭痛，嘔吐，蕁麻疹，支氣管收縮，過敏反應，無防禦性過敏反應，心絞痛

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組

學名：Vasopressin

商品名：PITRESSIN ★ 20UNIT/ML

中文名：必壓生注射液



六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師