用藥指導單張

衛教小組 DM5870201

學　名：Silver sulfadiazine

商品名：siliverzine 20GM(條)

中文名：燙膚舒乳膏



一、此藥品的用途是什麼？

局部預防及治療二級、三級燒傷的傷口化膿。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
灼傷治療一日1~2次，先清潔患處，以無菌手套塗佈完全並達2~3MM厚；一般感染症以適量塗敷，每日一至數次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 孕婦使用，應考慮有益性及危險性之比較。
2. 新生兒及早產兒，不推薦使用本劑。
3. 本劑與外用酵素製劑併用會減弱藥效，併用時應注意。
4. 廣範圍、大面積之使用場合，應定期測定血清滲透壓。
5. 本劑不可用於眼睛。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 藥物反應症候(搔癢、發紅、腫脹、丘疹、小水泡)出現時，應中止使用。
2. 若有過敏(發癢、發紅)菌交代症、白血球減少及皮膚疼痛等現象應中止使用。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.28