

用藥指導單張

衛教小組 DM7970201

學名：Methylprednisolone

商品名：solu-Medrol 500MG

中文名：舒汝美卓佑注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

腎上腺皮質機能不全，劇烈休克，支氣管性氣喘，膠原疾病，過敏反應，泛發性感染。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 作為有生命危險病情的輔助療法，推薦劑量是30 mg/kg以至少30分鐘時經靜脈投藥。
2. 依據臨床需求而定，此種劑量可於醫院內每4-6小時重複投藥一次共計48小時。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 採取逐漸減低劑量之投藥法，可使此類藥品引發之續發性腎上腺機能不全減至最低程度。
2. 腎上腺皮質類固醇用於甲狀腺功能不足（Hypothyroidism）和肝硬化的病人藥效會增強。
3. 患有眼睛單純性疱疹患者，腎上腺皮質類固醇應小心使用，因為可能發生角膜穿孔。
4. 在使用腎上腺皮質類固醇時可能會發生精神紊亂，依其程度輕重列為欣快感，失眠，情緒激盪，個性改變，嚴重抑鬱，胡言亂語。
5. 腎上腺皮質類固醇也會使既有的情緒不穩與精神病的傾向惡化。
6. 嬰兒與兒童長期使用腎上腺皮質類固醇時，需小心觀察其成長與發育。
7. 病人正在使用腎上腺類固醇，特別是大量使用時，宜避免各種免疫接種，因為可能會有神經系之併發症之傷害及缺少抗體反應。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM7970201

學名：Methylprednisolone

商品名：solu-Medrol 500MG

中文名：舒汝美卓佑注射劑



體液和電解質失調、肌肉無力、嚴重關節痛、骨質疏鬆、脊椎壓迫性骨折、胃潰瘍、脹氣、潰瘍性食道炎、延遲傷口癒合、瘀斑、面部紅斑、出汗增多、水腫之腦內壓升高、驚厥、眩暈、頭疼、抑制兒童發育、月經週期不規則、潛伏性糖尿病復發、增高眼壓、青光眼、突眼症、加濃或減低膚色、皮下萎縮、無菌性膿腫、虛脫、支氣管痙攣、蕁麻疹、噁心、嘔吐、心律不整、低血壓或高血壓。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師