# 用藥指導單張

衛教小組 DL4380101

學　名：Flunitrazepam

商品名：MODIPANOL F.C 1MG(管藥三)

中文名：美得眠膜衣錠




## 一、此藥品的用途是什麼？

失眠。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人患者的建議劑量為0.5-1 mg/day，特殊情況下可提高劑量至2 mg。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

1. 不建議使用benzodiazepines作為精神疾病首選治療的藥物。
2. 當病患有酒精及藥物濫用病史時，使用benzodiazepines，應特別小心。
3. 由於呼吸抑制的危險性，建議有慢性呼吸困難的病患應以較低劑量治療。
4. 請勿開車或操作機械。
5. 勿飲酒或葡萄柚汁。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

免疫系統方面：紅疹、血管性水腫及低血壓。

精神方面：精神混亂、情緒異常、幻覺、妄想，偶有性慾異常。

神經系統方面：整天嗜睡、頭痛、暈眩、警覺性降低、健忘、運動失調。

長期治療時可能會造成生理性依賴，若突然停藥會造成戒斷或反彈現象。

過量時會有低血壓、心臟呼吸抑制、昏迷甚至死亡的情況發生。我國已將其列為第三級毒品及第三級管制藥品。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19

# 用藥指導單張

衛教小組 DL4380101

學　名：Flunitrazepam

商品名：MODIPANOL F.C 1MG(管藥三)

中文名：美得眠膜衣錠




**六、此藥儲存時的條件為何？**

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19