用藥指導單張

衛教小組 DC3980201

學　名：Acetaminophen

商品名：acetaMINOPHEN(PARAN) 500MG

中文名：理冒伯樂止痛錠

需補藥品圖片

一、此藥品的用途是什麼？

退燒、止痛。

（ 緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛 ）

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人及12歲以上：發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4～6小時可重複服用，每次1～2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過4次。

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量1/4。

3歲以下，請洽醫師診治。

三、使用時我該注意的特別事項？

一、有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成份引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請假醫生診治：

1.3歲以下。

2.成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

3.有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

2.同時副用含有Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.23

用藥指導單張

衛教小組 DC3980201

學　名：Acetaminophen

商品名：acetaMINOPHEN(PARAN) 500MG

中文名：理冒伯樂止痛錠

需補藥品圖片

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1.若有任何不適情況產生。

2.服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

3.使用過量[每日超過4000mg]，或使用藥後出現以下症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下，避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.23