

用藥指導單張

衛教小組 DC0870101

學名：Zonisamide

商品名：ZONEGRAN F.C. 100MG

中文名：佐能安膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

ZONEGRAN成人局部癲癇發作之輔助治療。 ZONEGRAN適用於下列癲癇發作類型：

1. 單純性局部癲癇發作。
2. 複雜性局部癲癇發作。
3. 局部癲癇發作續發型之全身性強直-陣攣性發作。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人：

起始劑量為每日100mg。之後以一到二週為間隔逐漸提高劑量至每日200mg至400mg，分1至3次服用。每日最高劑量為500mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

有些患者可能會感到昏昏欲睡或難以集中注意力，特別是在治療初期或增加劑量後。必須告知患者，從事需要高度警覺性的活動時應謹慎，例如駕駛或操作機器。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

皮疹、頭暈、嗜睡。

六、此藥儲存時的條件為何？

30°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師